

PIRSUE®
Sterile SolutionPIRSUE®
Sterile Solution

ピルスーはピルリマイシン塩酸塩水和物を主成分とする乳房注入剤で、泌乳期の乳房炎治療を目的とする動物用医薬品である。ピルリマイシンはリンコマイシンの誘導体で、作用機序は静菌的であり、ピルリマイシン感受性菌においてリボゾームの50Sサブユニットに結合しタンパク合成を阻害する。ピルリマイシンは組織への浸透性が高いため、1日1回の投与で効果を発揮する。

【成分】

本剤1容器（10mL）

ピルリマイシン塩酸塩水和物……50.0mg（力価）
を含有する。

【効能・効果】

有効菌種

本剤感受性のブドウ球菌、レンサ球菌

適応症

牛：泌乳期の乳房炎

【用法・用量】

1日1回1分房当たり1容器を2日間注入する。

【使用上の注意】

（一般的注意）

- 本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。
- 本剤は効能・効果において定められた適応症の治療にのみ使用すること。
- 本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- 本剤の使用に当たっては、治療上必要な最小限の期間の投与に止めること。
- 本剤は、「使用基準」の定めるところにより使用すること。

（使用者に対する注意）

本剤が誤って使用者等の目、鼻、口等に入ったときは、直ちに水で洗浄やうがい等を行い医師の指示を受けること。また、本剤の取り扱い中に誤って使用者の手等に付着した場合は、直ちに石鹸等で洗い流すこと。

（牛に対する注意）

1. 副作用

副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

2. 適用上の注意

本剤を注入する際は、乳頭を十分に消毒すること。

（取扱い上の注意）

- 容器先端のノズルは清潔に取扱うこと。
- 使用済みの容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

（保管上の注意）

- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 本剤は直射日光を避け、25℃を越える場所で保管しないこと。

（その他の注意）

一般的にブドウ球菌は臨床型乳房炎の初期段階であっても細胞内に侵入、あるいは微小膿瘍を形成することが知られており、こうした症例は難治性であるとされている。

注意—獣医師等の処方せん・指示により使用すること。

注意—使用基準の定めるところにより使用すること。

注意：本剤は薬事法第83条の4の規定に基づき前記の用法及び用量を含めて使用者が遵守すべき基準が定められた医薬品であるので、牛について前記の用法及び用量並びに次の使用禁止期間を遵守すること。

牛：食用に供するためにと殺する前20日間又は食用に供するために搾乳する前60時間

【貯法】

室温保存 ただし25℃を超えないこと。

【有効期間】

36ヵ月

【包装】


10mL×12本

【使用方法】

ピルスーを注入する際は、以下の手順に従って乳房内に注入してください。

- 白いキャップを上へ引き上げて外します。
- 注射針の長さを以下の通り選択した上で、乳頭管に挿入し薬剤を注入してください。

a) 深部注入 b) 浅部注入



本剤に関するお問い合わせは下記までお願い致します。

ゾエティス・ジャパン株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-22-7

TEL：0120-334602 FAX：0120-554417

製造販売（輸入）

ゾエティス・ジャパン株式会社

〒151-0053 東京都渋谷区代々木3-22-7

®登録商標
Z001